


# Dlaczego rzucenie palenia jest tak ważne w opiece nad osobami HIV+?

## Analiza umieralności u pacjentów HIV+ i osób palaczy mieszkających w Danii w latach 1995-2010 (N=13,563)

Przeżycia według wieku, Survival by Age, stratyfikacja według HIV i statusu palenia<sup>1</sup>



Palenie jest ważną przyczyną przedwczesnej śmierci<sup>3</sup>

Rzucenie palenia powinno stać się priorytetową interwencją wśród pacjentów HIV+<sup>3</sup>

CI, confidence interval.

1. Helleberg M, et al. Clinical Infectious Diseases 2013;56:727-734.
2. Veterans Health Administration. HIV Provider Smoking Cessation Handbook. July 2012.
3. Bedimo R, et al. ID Week 2017. San Diego, CA. Oral #2473

Długość życia 35-letniego pacjenta HIV+, według statusu palenia<sup>1</sup>

Status palenia	Wiek (95% CI)
obecny palacz	62.6 (60.9-64.9)
były palacz	69.1 (67.5-71.2)
nigdy niepalący	78.4 (71.9-84.9)

Skuteczność terapii dla rzucenia palenia<sup>2</sup>

Lek	Abstynencja po 6 miesiącach, %
Listek + guma/pastyłka	37
wareniklina 2mg	33
bupropion + pastyłka	30
Listek + bupropion	29
guma	26